

5 НАЈЧЕСТИ СЦЕНАРИЈА

Научен советник Д-р.сци
Нико Беќаровски

Сценарио 1

Пациентка на 23 години, донесена со Брза
Помош со следната клиничка состојба

- Бессознание
- Срцебиење
- Проширени зеници
- Зацрвенето лице
- Психомоторен немир
- Дезориентираност
- Тахипнеа

????????????????????

Сценарио 1

ОДГОВОР: ТРУЕЊЕ СО АНТИДЕПРЕСИВИ

ТЕРАПИЈА :

Лаважа

Медицински јаглен

Симптоматска терапија

Друго??

Сценарио 2

- Пациент на 33 години, донесен од своите другари со клиничка состојба

Кома

Брадикардија, со апнеа

Тесни зеници

Срцева фреквенција 50/мин

Крвен притисок 70/40ммХг

Цијаноза

Сценарио 2

ОДГОВОР: ПРЕДОЗИРАНОСТ СО МЕТАДОН
И ДИАЗЕПТАМ

ТЕРАПИЈА

Давање на антидоти Налоксон и Флумазенил

Оксигенотерапија

Обезбедување на витални функции (дишење,
срцева акција..)-интубација

Хидрирање (кристални раствори, плазма
експандери)

Друго

Сценарио 3

Пациентка донесена од мајка и по пиење на поголема количина (10-15 табл.).

Таблетите се против болка, незнаат како се викаат. Пациентката со клиничка состојба:

- Малаксаност, премаленост
- Гадење, повраќање, болки во стомакот по десен ребрен лак
- Зголемени трансаминази и билирубини
- Продолжено протромбинско време

Сценарио 3

ОДГОВОР: ТРУЕЊЕ СО ПАРАЦЕТАМОЛ

ТЕРАПИЈА

Лаважа

Н ацетил цистеин

Медицински јаглен

Симптоматска

Сценарио 4

Пациент на 54 години донесен со следната клиничка состојба

Препотен

Бесознание

Немерлив крвен притисок

Немерлива срцева акција

Екг



(Courtesy of Armstrong Medical Industries, Lincolnshire, IL.)

Сценарио 4

ОДГОВОР: ТРУЕЊЕ СО ВЕРАПАМИЛ

ТЕРАПИЈА

CaCl₂

Глукагон

Хидрирање

Друго

Други evidence based применливи лекови во третман на труења со Са антагонисти, кои се влезени и во клиничка патека на УК Токсикологија цо третман на ваков тип на труења во зависност од состојбата на пациентот се: Атропин, Изопреналин инфузија, норадреналин инфузија, добутамин, вазопресин, инсулин-глукоза еугликемија третман

Сценарио 5

Пациент јадел габи пред 3 часа. Донесен во клиничка состојба

Дезориентираност

Зголемена саливација

Миоза

Дијареа

Зголемено потење

Гастроинтестинални потешкотии

Сценарио 5

ОДГОВОР ТРУЕЊЕ СО ГАБИ СО ПРЕДОМИНАНТЕН ХОЛИНЕРГИЧЕН СИНДРОМ-ІНОСУВЕ ТЕРАПИЈА

- Супортивен третман
- Бензодијазепини при агитираност и грчеви
- Атропин при бронхореа по 1 mg до престанок на бронхореата.

ПРАШАЊА И КОНТАКТ

nikobekarovski@gmail.com

Mob/viber/whatsApp +38978440017

Messenger: Niko Bekjarovski